

Э 158 **Эволюция жизни на Земле: Материалы III Международного симпозиума, 1–3 ноября 2005 г., г. Томск / Отв. редактор В.М. Подобина. – Томск: Томский государственный университет, 2005. – 440 с.: ил. и цв. вкл.**

ISBN 5-94621-147-X

E 158 **Evolution of Life on the Earth: Proceedings of the III International Symposium, November 1–3, 2005, Tomsk / Editor-in-Chief V.M. Podobina. – Tomsk: TSU Publishing House, 2005. – 440 p., ill.**

RECENT DATA ON FOSSIL MAMMALS FROM UPPER PLIOCENE DEPOSITS OF THE EASTERN STAVROPOL REGION

A.S.Tesakov¹, G.A.Pismenskaya²

¹**Geological Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia**

²**Federal State Geological Enterprise “Kavkazgeols’emka”, Essentuki, Russia**

НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ИСКОПАЕМЫМ МЛЕКОПИТАЮЩИМ ИЗ ВЕРХНЕПЛИОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ВОСТОЧНОГО СТАВРОПОЛЯ

А.С. Тесаков¹, Г.А. Письменская²

¹*Геологический институт РАН, г. Москва, Россия*

²*ФГУТП «Кавказгеолсъемка», г. Ессентуки, Россия*

Геологическая летопись плио-плейстоценовых отложений Северного Кавказа и Ставрополя в частности, несмотря на давнюю историю изучения, уходящую своими корнями в начало прошлого столетия, относительно бедна находками остатков наземных позвоночных. Это затрудняет их использование для целей стратиграфии при геологическом картировании и поисках полезных ископаемых в регионе. Тем более важными представляются новые данные, полученные при выполнении работ на территории листа L-38-XXII Предкавказской геолого-съемочной партией ФГУТП «Кавказгеолсъемка».

Наибольшее количество сообщений об ископаемых млекопитающих Ставрополя связано с отложениями миоцена. Наиболее известны раннемиоценовые фауны у станицы Беломечетская [5, 7] и позднемио-

ценовые ассоциации района Армавира [2], а также ископаемые млекопитающие Косякинского карьера близ Ставрополя [1, 3, 5, 6], датированные большинством авторов в пределах позднего миоцена и раннего плиоцена. Все эти местонахождения заслуживают дополнительного изучения, и их рассмотрение выходит за рамки нашего сообщения.

Обзор геологических условий находок млекопитающих позднеплиоценового и эоплейстоценового возраста был дан Н.А. Лебедевой [9]. Среди описанных ею материалов наибольшее биостратиграфическое значение имеют находки в долине р. Сабля и в западных окрестностях г. Георгиевск. Здесь были найдены точки прямой корреляции акчагельских морских отложений и континентальных образований этого возраста. Нам удалось собрать дополнительные палеон-

тологические материалы в этих районах, уточнить их геологическое положение в разрезах и корреляционное значение с использованием современных биостратиграфических шкал.

Район исследования находится на восточном склоне Ставропольской возвышенности (рис. 1), его мезозойско-кайнозойский осадочный чехол, охватывающий большой возрастной диапазон, большей частью принадлежит зоне Предкавказских краевых прогибов и поднятий, сформированных на Скифской эпигерцинской плите. Из-за слабого эрозионного вреза на территории он плохо обнажен. Значительные площади перекрыты плиоцен-четвертичными отложениями значительной мощности.

1 – пески светло-серые среднезернистые слабоцементированные наклоннослоистые, слоистость подчеркивается ритмичным чередованием средне- и крупнозернистых песков, мощность 0,6 м;

2 – песчаники мелко- среднезернистые мульдобразно-косослоистые с признаками градационной слоистости: к кровле зернистость уменьшается до мелкой и тонкой, слоистость постепенно становится пологоволнистой, мощность 0,06–0,08 м;

3 – на слабоволнистой поверхности предыдущего слоя крутонаклонное переслаивание средне- крупнозернистых песчаников и гравелитов с размером гравийных зерен 2–5 мм и редкой «плавающей» мелкой (10 мм) галькой кварца, аз. пад. косой слоистости 190°,




Рис. 1. Обзорная схема района работ (масштаб 1:500 000): ▲ – местонахождения ископаемых млекопитающих: 1 – Сабля-1 («Зубова Гора»); 2 – Сабля-2; 3 – Георгиевск

Fig. 1 Schematic map of the work area (1:500 000): ▲ - fossil mammal localities: 1 - Sablya-1 ("Zubova Gora"); 2 - Sablya-2; 3 - Georgievsk

Отложения ачкагыльского морского бассейна и их прибрежно-морские аналоги в настоящее время рассматриваются в составе карамыкской толщи.

В районе с. Саблинское отложения карамыкской толщи размещены на средне-верхнемиоценовых отложениях Центральной подзоны Центрально-Предкавказской структурно-формационной зоны, а в районе г. Георгиевска – на отложениях черногорской толщи, охватывающей возрастной диапазон от карагана до среднего сармата включительно и принадлежащей Кабардинской подзоне Восточно-Кавказской структурно-формационной зоны.

Сабля. Нами изучены несколько небольших разрезов отложений карамыкской толщи в районе с. Саблинского, в двух из них получены представительные материалы.

В заброшенном карьере на СЗ окраине села № 44°31'47,4" Е 43°13'45,7" («Зубова Гора») обнажаются снизу вверх (рис. 2, а) следующие слои:

угол 28–30°, в то время как поверхность слоя залегает с аз. пад. 340°, угол 10°, мощность 0,1–0,2 м;

4 – конгломерат со слабо окатанной и плохо сортированной галькой известняков и плотных глин, преобладающий размер галек 1–2 см, единичные достигают 10 см, заполнителем служит песчано-гравийный материал, мощность 0,4 м;

5 – пески слюдяные средне-крупнозернистые светло-серые слабоцементированные наклоннослоистые с округлыми галькообразными обособлениями глин до 5 см в диаметре, мощность 0,12–0,15 м;

6 – пески уплотненные мульдобразно-косослоистые, с признаками градационной слоистости (в основании косых слойков гравийно- мелкогалечниковый материал), мощность 0,4 м;

7 – пески слабо уплотненные средне-мелкозернистые с мелкой мульдобразно-косой слоистостью к кровле переходят в тонкозернистые уплотненные пески волнистослоистые, мощность 0,3 м.

Из косослоистых песков и гравелитов слоя 3 определены следующие формы (рис. 3): *Mimomys* ex gr. *praepliocaenicus* (2), *Mimomys hintoni livenzovicus* (6), *Pitymimomys* ex gr. *stenokorys* (6), *Borsodia praeungarica praeungarica* (3), *Clethrionomys* ex gr. *primitivus* (2), *Nannospalax* sp. (2), *Leporidae* gen. (1), *Carnivora* sp. indet. (1), *Cervidae* gen. et sp. indet. (1), *Equus* ex gr. *stenonis* (1).

Представленная ассоциация млекопитающих из песков у СЗ окраины с. Саблинское содержит остатки грызунов (корнезубых полевых и слепышей), зайцеобразных, копытных и хищных млекопитающих. Она относится к хапровскому фаунистическому комплексу (региональная биозона MNR3) и позволяет датировать вмещающие отложения началом позднего плиоцена, началом позднего акчагыла (при двучленном делении) и интервалом времени около 2,6–2,4 млн лет (рис. 4). Разрез «Зубова Гора» был подробно изучен Н.А. Лебедевой [10]. Ею указываются совместные находки зубов слона *Archidiskodon gromovi*, мастодонта *Anancus arvernensis* и раковин акчагыльских моллюсков (*Cardium domra*, *Mastra subcaspia*). Остатки мелких млекопитающих из этого разреза были впервые собраны Л.И. Алексеевой в 1976 г. Определенная здесь ассоциация мелких млекопитающих [11] полностью совпадает с новыми, более полными материалами (за исключением присутствия остатков крота *Talpa* sp.).

Еще одно обнажение песчано-глинистых отложений связано с заброшенным карьером на южной окраине села, около мельницы (N 44°30'44,4" E 43°14'17,8"). Для этого разреза характерно отсутствие волнистых и косых серий и более тонкий материал по сравнению с вышеописанным. Снизу вверх обнажаются (рис. 2, б) следующие слои:

- 1 – пески серовато-желтые мелкозернистые уплотненные, мощность 0,3 м;
- 2 – песчаники средне-крупнозернистые с тонкими «струями» гравелитов, мощность 0,5 м;
- 3 – пески светло-серые слабосцементированные с горизонтами уплощенных пустот, мощность 3 м;
- 4 – глины зеленовато-серые слоистые, мощность 0,3 м;
- 5 – песчаники мелко-среднезернистые зеленовато-серые, мощность 0,3 м;
- 6 – глины голубовато- и зеленовато-серые, мощность 0,25 м;
- 7 – суглинки серовато-желтые с примесью мусорного материала, мощность 0,4 м.

В глинах и тонкозернистых песках был обнаружен фрагмент верхнечелюстной кости с первыми коренными зубами обоих рядов полевки *Mimomys hintoni* (рис. 3). По эволюционному уровню корнезубой полевки мимомиса вмещающие отложения отвечают хапровскому комплексу и, очевидно, близки по возрасту отложениям, изученным на СЗ окраине села.

Георгиевск. В районе г. Георгиевск нами изучен разрез плиоценовых отложений, обнажающихся в большом песчаном карьере в 10 км к западу от г. Георгиевска, на левом берегу долины р. Кумы, в 2 км

восточнее пос. Терский. В карьере непосредственно к югу от автомобильной дороги Терский – Георгиевск (N 44°11'35,9" E 43°20'29,1") описан следующий разрез (рис. 2, в):

1 – пески полимиктовые светло-серые разнозернистые уплотненные с прослоями (5–20 см) среднекрупнозернистых песчаников и тонкими прослоями через 1,5–2 м по 7–10 см (часто линзующимися) конгломератов с галькой известняков диаметром 1–2 см, встречаются отпечатки двустворчатых моллюсков *Cerastoderma dombra*, крупные обломки костей в известково-песчаном материале, мощность отложений составляет 2–2,5 м;

2 – выше, на волнистой размытой поверхности, залегает переотложенный плохосортированный костеносный горизонт, представленный мусорными серыми песками с гравийным и мелкогалечниковым материалом, мощность меняется от нескольких сантиметров до 1–1,2 м.

Из плохосортированных галечников и гравия, залегающих с разрывом над акчагыльскими песками под современной почвой, в верхней части разреза промывкой и просеиванием собраны остатки корнезубой полевки *Mimomys praepliocaenicus* (рис. 3).

По эволюционному уровню корнезубая полевка из георгиевской фауны близка к форме из Саблинской, что позволяет датировать вмещающие отложения также началом позднего плиоцена и средним–поздним акчагылом и относить к хапровскому фаунистическому комплексу.

Из района г. Георгиевска указывались также остатки крупных млекопитающих. Наиболее известная находка целого скелета южного слона *Archidiskodon meridionalis* [8]. Она происходит из так называемого «Нового карьера», который был расположен на правом берегу р. Кумы, против западной окраины с. Подгорное и связан с 45–50 м террасовым уровнем. По заключению В.Е. Гарутта [8], по эволюционному уровню георгиевский слон *A. meridionalis* более прогрессивен, по сравнению с формой хапровского фаунистического комплекса (*A. gromovi*), что позволяет датировать вмещающие отложения в интервале нижнего и среднего апшерона. В 70-х гг. прошлого века Л.И. Алексеевой в том же карьере были собраны остатки мелких млекопитающих, среди которых мною были определены *Mimomys* cf. *reidi* Hinton, *Mimomys* cf. *pliocaenicus* F. Major, *Borsodia* ex gr. *newtoni-aran-koides*, *Clethrionomys kretzoi* (Kow.) [11]. Эта фауна позволяет датировать вмещающую континентальную толщу концом позднего плиоцена, самым концом акчагыла и отнести к псекупскому фаунистическому комплексу. Практически идентичная фаунистическая ассоциация известна из позднеплиоценовых отложений р. Псекупс, ниже ст. Саратовской [4, 11].

Наши находки связаны, очевидно, с более древним (60–70 м) террасовым уровнем, а само местонахождение расположено западнее «Нового Карьера». Находка *Mimomys praepliocaenicus* широкоареального




Рис. 2. Разрезы плиоцен-четвертичных образований: А – Сабля-1 (Зубова Гора), Б – Сабля-2, В – Георгиевск: 1 – пески слабо уплотненные; 2 – пески косослоистые, гравийные зерна (а) и мелкая галька (б), 4 – галечники и валуны, 5 – прослой известняка, 6 – суглинки (а) и почвы (б)

Fig.2. Sections of Pliocene-Quaternary deposits: А - Sablya-1 (Zubova Gora), Б - Sablya-2; В - Georgievsk: 1 - sands poorly compacted; 2 - sands cross-bedded, gravel (a) and small pebble (б); 4 - pebbles and boulders; 5 - limestone interbeds; 6 - loams (a) and soils (б)




Рис. 3. Мелкие млекопитающие из изученных разрезов.

1-2 - *Mimomys praeplicocaenicus*: 1 - Георгиевск, фрагмент m1, a, b - лабиальная и лингвальная стороны; 3-6 - *Mimomys hintoni livenzovicus*: 3 - Сабля-1, фрагмент m1, a - лабиальная сторона, 4 - Сабля-2, фрагмент M3, 5 - Сабля-1, фрагмент m1, 6 - Сабля-2, a, b - лабиальная и лингвальная стороны; 7-9 - *Pitymimomys ex gr. stenokorys*, Сабля-1: 7 - фрагмент m1, 8 - фрагмент M1, 9 - фрагмент M2; 10-11 - *Borsodia praehungarica*, Сабля-1: 10 - фрагмент m1, a - лабиальная сторона, 11 - фрагмент m3; 12 - *Clethrionomys primitivus*, Сабля-1, фрагмент M2, a, b - лингвальная и передняя стороны. Длина масштабного отрезка 1 мм

Fig.3. Small mammals from the studied sections.

1-2 - *Mimomys praeplicocaenicus*: 1 - Georgievsk, m1, 2 - Sablya-1, m1, a, b - labial and lingual sides; 3-6: *Mimomys hintoni livenzovicus*: 3 - Sablya-1, fragmentary m1, a - labial side, 4 - Sablya-1, M3, 5 - Sablya-1, m1, 6 - Sablya-2, a, b - labial and lingual side; 7-9: *Pitymimomys ex gr. stenokorys*, Sablya-1, 7 - fragmentary m1, a - labial side, 8 - M1, 9 - fragmentary M2; 10-11: *Borsodia praehungarica*, Sablya-1, 10 - fragmentary m1, a - labial side, 11 - m3; 12: *Clethrionomys primitivus*, Sablya-1, M2, a, b - lingual and anterior sides. Scale bar equals 1 mm.

Ma	Magnetostratigraphical scales	Series	Subseries	Stage	Stages Eastern Paratethys	Continental scale	MN units	MNR-MQR zones	Position of studied localities	
1	C1r 2r	Pleistocene	Lower	Calabrian	Apsheonian	Biharian	Q1	MQR 8	Sablya Georgievsk	
	C2n									MQR 9
2	C2r 1r 2r	Upper	Gelasian	Villafanchian				17		MQR 10+11
	C2r									MNR 1+2
3	C2An 1n 2r 3n	Pliocene	Middle	Piacenzian	Villanyian	16	MNR 3			
							a		MNR 4	
							b	MNR 5		

Рис. 4. Биостратиграфическая схема среднего-позднего плиоцена юга России

Fig.4. Bistatigraphic scheme of Middle-Late Pliocene of the southern Russia

европейского вида, биозона которого охватывает верхи среднего и низы позднего плиоцена [11], впервые дает надежное палеонтологическое обоснование древнего террасового уровня западнее г. Георгиевска.

Таким образом, полученные новые данные существенно дополняют наши знания о биостратиграфической корреляции средне-позднеакчагыльских отложений Восточного Ставрополя и их аналогов, позволяют датировать их в интервале 2,6–2,4 млн лет и сопоставить со временем существования ханпровского фаунистического комплекса, зоной MN17 европейской шкалы и региональной биостратиграфической зоной MNR3 Восточной Европы (рис. 4).

Авторы признательны Л.А. Алексеевой за предоставление костного материала и геологических описаний района исследований, И.Ф. Рудянову и В.Ф. Печенюку за большую практическую помощь в организации проведения полевых работ.

Литература

1. Аверьянов А.О., Тесаков А.С. Зайцеобразные (Mammalia, *Lagomorpha*) из раннеплиоценового местонахождения Косякино на Северном Кавказе // Палеонтол. журн. 1998. № 3. С. 91–96.
2. Алексеева Л.И. Териофауна раннего антропогена Восточной Европы: Тр. Геол. ин-та АН СССР. 1977. Вып. 300. 214 с.
3. Алексеева Л.И., Швырева А.К. Косякинский карьер – кладовая верхнеплиоценовой териофауны // Континентальный плиоцен Черноморско-Каспийской области. М.: ГИН АН СССР, 1986. С. 121–138.
4. Вангенгейм Э.А., Певзнер М.А., Тесаков А.С. Магнитно-биостратиграфические исследования в страторегии псекупского фаунистического комплекса млекопитающих // Бюл. Комиссии по изучению четвертичного периода АН СССР. 1990. № 59. С. 81–93.
5. Верещагин Н.К. Млекопитающие Кавказа. М.; Л.: АН СССР, 1959. 703 с.
6. Габуния Л.К. Об остатках млекопитающих из среднего плиоцена Северного Кавказа (Косякино) // Палеонтол. журн. 1961. № 1. С. 163–165.
7. Габуния Л.К. Беломечетская фауна ископаемых позвоночных. Тбилиси: Мецниереба, 1973. 137 с.
8. Гарутт В.Е., Сафронов Н.И. Находка скелета южного слона *Archidiskodon meridionalis* (Nesti) близ г. Георгиевска (Северный Кавказ) // Бюл. Комиссии по изучению четвертичного периода. 1965. Т. 4, № 30. С. 79–88.
9. Лебедева Н.А. Континентальные антропогеновые отложения Азово-Кубанского прогиба и соотношение их с морскими толщами // Тр. ГИН АН СССР. М.: АН СССР, 1963. Вып. 84. 105 с.
10. Корреляция антропогеновых толщ Понто-Каспия. М.: Наука, 1978. 135 с.
11. Тесаков А.С. Биостратиграфия среднего плиоцена–эоплейстоцена Восточной Европы (по мелким млекопитающим). М.: Наука, 2004. 247 с.